

**Empfehlungen zu Impfintervallen für Hunde der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: September 2017**

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
<b>CPV</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
<b>CDV</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
<b>Tollwut</b>	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen), dann nach 1 Jahr	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen), dann nach 1 Jahr	nach Herstellerangabe ((1-) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO)
<b>Leptospirose</b>	ab 12. Woche 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle (6 -) 12 Monate, je nach Infektionsgefahr, möglichst im Frühjahr
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
<b>HCC</b>	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
<b>Para-influenza</b>	<u>subkutan</u> : ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3 -4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>subkutan</u> : 1 x, dann nach 1 Jahr <u>intranasal</u> : 1 x	<u>subkutan</u> : bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre <u>intranasal</u> : bei Bedarf
<b>B. bronchi-septica</b>	<u>intranasal</u> : 1 x ab 8. Woche	<u>intranasal</u> : 1 x	<u>intranasal</u> : bei Bedarf
<b>CHV-1</b>		nur bei Zuchthündinnen: während der Läufigkeit oder 7-10 Tage nach dem Decktermin, dann 1-2 Wochen vor der Geburt	nur während der Zucht
<b>Borreliose</b>	nicht empfohlen		
<b>Babesiose<sup>1</sup></b>		bei Hunden in endemischen Gebieten oder mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen oder östlichen Ausland: ab 6 Monaten 2 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle (6-12) Monate
<b>Leish-</b>		bei Hunden mit	alle 12 Monate

<b>maniose</b>		regelmäßigen Aufenthalt im südlichen Ausland: ab 6 Monaten 3 x im Abstand von 3-4 Wochen	
<b>Dermato- phytose</b>	nicht empfohlen		

(CPV = canines Parvovirus, CDV = canines Staupevirus, HCC = Hepatitis contagiosa canis, *B. bronchiseptica* = *Bordetella bronchiseptica*, CHV-1 = canines Herpesvirus)

<sup>1</sup>Einfuhr über internationale Apotheke